

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КОЛМЕ (COLME)

(Цианамид)

капли для приема внутрь 60 мг/мл

Рег. Номер: № П № 011263/01

Состав: в 100 см³; в 1 капле;
Цианамид6 г3 мг

Экципипенты: кислота сорбиновая, кислота уксусная ледяная, натрия ацетат, вода для инъекций.

Фармакологические свойства

Действие цианамида основано на блокаде ацетальдегиддегидрогеназы, которая участвует в метаболизме этилового спирта. Это приводит к повышению концентрации метаболита этилового спирта – ацетальдегида, вызывающего отрицательные ощущения (приливы крови к лицу, тошноту, тахикардию, одышку и т.п.) которые делают чрезвычайно неприятным употребление алкоголя после приема цианамида. Это приводит к условно-рефлекторному отвращению к вкусу и запаху спиртных напитков.

Сенсибилизационное воздействие цианамида на алкоголь проявляется раньше (примерно через 45-60 минут) и длится меньше (около 12 часов), чем воздействие дисульфирама. Также в отличие от дисульфирама цианамид не обладает гипотоническим эффектом.

Показания к применению

КОЛМЕ применяется для лечения больных хроническим алкоголизмом и профилактики рецидивов.

Противопоказания

Тяжелые сердечные заболевания, заболевания дыхательных путей и почек со снижением функций, тяжелые заболевания печени, беременность, период грудного вскармливания, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы

Лечение назначается после тщательного обследования больного и предупреждения о последствиях и осложнениях. Препарат принимается внутрь по 36-75 мг (12-25 капель 2 раза в сутки с интервалом в двенадцать часов) по индивидуальной схеме.

Для дозирования следует разбить ампулу, содержащую раствор препарата, вылить содержимое во флакон, вложенный в упаковку, и надеть на флакон капельницу. Флакон должен быть плотно закрыт.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Следует избегать назначения КОЛМЕ вместе с метронидазолом, изониазидом, фенитоином и другими ингибиторами альдегида дегидрогеназы, которые могут усилить реакцию с алкоголем. После приема дисульфирама, перед назначением КОЛМЕ, должен быть перерыв не менее 10 дней.

КОЛМЕ не совместим с препаратами альдегидной группы (паральдегид и продукты хлорала).

Реакция на алкоголь

При одновременном приеме с алкоголем появляются следующие симптомы: выраженная гиперемия кожных покровов, «пульсация» в голове и шее, тошнота, тахикардия, затруднение дыхания, слабость, нечеткость зрения, обильное потоотделение, боль в груди. В наиболее тяжелых случаях – рвота, снижение артериального давления, угнетения дыхания, коллаптоидное состояние. Характер и степень тяжести симптомов зависят от количества

принятого алкоголя и препарата. В тяжелых случаях необходимо провести симптоматическую терапию направленную на поддержание функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы, внутривенное вливание антигистаминных препаратов.

Побочное действие

Препарат, как правило, хорошо переносится, если не употребляется алкоголь. Иногда возможны усталость, сонливость, кожные высыпания, шум в ушах, транзиторный лейкоцитоз.

Предупреждение

КОЛМЕ должен применяться только под наблюдением врача и с ведома пациента. Может возникнуть реакция на алкоголь, содержащийся в некоторых медикаментах и пищевых продуктах.

Лечение КОЛМЕ можно начинать только по истечению 12 часов с момента последнего приема алкоголя. КОЛМЕ должен применяться с осторожностью в тех случаях, когда реакция на одновременный прием с алкоголем может повлечь за собой риск для здоровья пациента: при гипертиреозе, сахарном диабете, эпилепсии, сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях почек. При длительном приеме рекомендуется контролировать функцию щитовидной железы не реже, чем один раз в полгода.

В случае приема слишком больших доз препарата рекомендуется промыть желудок и назначить симптоматическое лечение, направленное на поддержание функций печени, дыхания и сердечно-сосудистой системы, также необходим контроль за показателем гематокрита, и в случае необходимости, переливание крови.

Передозировка (интоксикация) препаратом

В случае приема слишком больших доз препарата рекомендуется промыть желудок и назначить симптоматическое лечение, направленное на поддержание функций печени, дыхания и сердечно-сосудистой системы, также необходим контроль за показателем гематокрита и, в случае необходимости, переливание крови.

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь по 15 мл в ампулах из коричневого стекла в комплекте с флаконом-дозатором (капельницей).

Условия хранения:

Список Б

хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Препарат отпускается по рецепту врача.

Производитель:

«ИПСЕН ФАРМА, С.А.» Испания
08980 Сан-Фелиу-дельобрегат (Барселона)
карретера де Лауреа Миро, 395

Представительство в Москве:

ООО «Фармлюкс»
115432 Москва ул. Трофимова д.6
тел: в Москве.
(495) 677-70-73
(495) 677-70-44

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ